ALGUNOS CARABIDÆ RAROS DEL URUGUAY

Por

GONZALO J. FERNÂNDEZ

De las especies citadas en esta breve nota, algunas ocurren con muy poca frecuencia en el país, de suerte que su hallazgo constituye una verdadera novedad; otras son raras únicamente en los departamentos del sur.

Calosoma (Castrida) argentinense Csiki.

Queda incorporado a nuestra fauna mediante 1 ejemplar que hallé en el Prado de Montevideo, el 14 de febrero de 1932, durante la noche. Posteriormente han aparecido nuevos ejemplares en Montevideo y Río Negro. Mientras que el común *Calosoma retusum* F. parece tener predilección por los meses de primavera, esta especie sería aquí más propia del verano (todos los ejemplares que hallé son de febrero o marzo).

A primera vista, podría ser confundido con ejemplares totalmente cobrizos de *C. retusum* F, pero es proporcionalmente más corto, y las estrías y costillas de los élitros son bien diferentes en ambas especies.

Rhytidognathus ovalis (Dej.)

Este Carabino parece ser muy raro. Mi único ejemplar procede del Cerro de Montevideo; fué hallado el 17 de octubre de 1933, debajo de estiércol.

Distichus ebeninus Lynch. Arr.

El señor Tremoleras cita en sus "Notas sobre Carábidos platenses" (Rev. de la S. E. A., 1931, p. 240), 1 ejemplar procedente de "Montevideo".

Mis 4 ejemplares son de San José (Barra del Río Santa Lucía), habiéndolos hallado en enero de 1933 entre los detritus de la costa

del citado río. (Uno de dichos ejemplares, actualmente en la colección de mi colega y amigo señor Juan M. Bosq).

Barypus speciosus Dej.

Este magnífico Broscino parece ser abundante en los departamentos de Minas y Treinta y Tres. Pero, aunque en corto número puede verse también al sur (Canelones, San José), durante los meses de verano.

Respecto a este insecto se observa un hecho curioso: antes de la salida del sol, se le encuentra debajo de piedras o de estiércol seco; pero hacia el mediodía, es raro hallarlo en los campos, y en cambio, frecuente verlo correr sobre lugares lisos y duros, por ejemplo, sobre el hormigón (mis ejemplares de Canelones, excepto 1, fueron hallados en la carretera, a la altura de Juanicó); sobre los taludes de cemento de los rieles ferrocarrileros; en las explanadas duras o pedregosas de las orillas de algunos arroyos, etc. Hecho semejante se constata para el *Barypus rivalis* (Germ.) (1), tan común en el Cerro de Montevideo hacia el fin del verano; se hallan a veces en crecido número corriendo por las canaletas de drenaje de la falda del cerro, que son de cemento.

Hasta ahora, la localidad de Suárez (Canelones), marca el límite sur de distribución del *B. speciosus* Dej., en el país.

Pterostichus (Feronomorpha) currens Brull.

El 15 de marzo de 1932, hallé 1 ejemplar ♀ de este rarísimo Carábido en la ciudad (Barrio del Reducto, calles Millán y Domingo Aramburú).

Este ejemplar es apenas más pequeño que el de la colección Tremoleras, el cual procede de un jardín del mismo Barrio Reducto.

Fuera de estos 2 ejemplares, y del que le sirvió a Brullé para establecer la especie, no tengo noticias de otros que hayan sido colectados en el Uruguay. Resalta el tamaño de esta especie entre los demás *Pterostichus* platenses, cuyas tallas son notablemente menores.

---

(1) El color del *B. speciosus* Dej., es constante; no así el de *B. rivalis* Germ., pues al lado de ejemplares de un verde brillante, los hay cobrizos, azulados, violados, hasta totalmente negros; estos últimos frecuentemente mate, desprovistos de brillo.

Lachnophorus Montoroi Tremls.

Es abundante en las márgenes de los ríos Negro y Yí; su límite sur queda señalado por la localidad de Santa Lucía (Canelones), donde lo capturé en escasa cantidad el 10 de febrero de 1934, en las orillas del río del mismo nombre, junto con abundantes *Bembidion convergens* Berg.

Ega argentina Brèthes.

Queda incorporada a nuestra fauna, mediante varios ejemplares (de los cuales 4 en mi colección), hallados por el joven C. Carbonell, en las orillas del Río Negro (Rivera, Paso de Arriera, durante el mes de enero de 1933).

Helluomorpha rubricollis Schaum.

No conozco que esta especie haya sido citada hasta ahora para el Uruguay. La hallé por primera vez el 17 de marzo de 1932 en el Prado de Montevideo (1 ejemplar, a la luz eléctrica); pero después, aunque en contadas ocasiones, ha aparecido en el mismo sitio (octubre del 32), y en el Cerro de Montevideo (enero de 1936).

Lebia perspicillaris Chaud.

Del departamento de Flores (Estancia "La Criolla", 9 de abril del 34), procede mi único ejemplar, capturado por el señor E. Montoro Guarch, a cuya gentileza lo debo.

Septiembre 3 de 1937.